Stratamark®

pentru prevenirea și
tratamentul vergeturilor

O inovație în prevenirea și tratarea vergeturilor





Heal Better™
Stratpharma
Romania

ro.stratamark.net

Vergeturile pot fi mai mult decât o preocupare cosmetică

Vergeturile sunt o afecțiune a pielii bine recunoscută și comună, care poate fi un motiv de mare **îngrijorare** și **nesiguranță** în timpul și după sarcină.[1]

Vergeturile sunt un tip de cicatrice anormală subțire și aplatizată. Cauza apariției vergeturilor nu este pe deplin înțeleasă, însă se crede că se datorează unei modificări anormale a țesutului subiacent al pielii sau modificărilor hormonale asociate cu sarcina, pubertatea, culturismul, terapia de substituție hormonală, etc.[2]

Deși nu sunt dăunătoare pentru sănătate, vergeturile pot provoca simptome fizice, cum ar fi mâncărimi, sensibilitate și durere. Din cauza **aspectului lor vizual**, acestea pot afecta, de asemenea, în mod semnificativ **stima de sine** și imaginea cuiva.[1]

Striae Distensae este termenul generic pentru vergeturi, dar există mai multe clasificări diferite.

Striae Gravidarum descrie vergeturile care apar din cauza sarcinii.



Striae Rubrae
sunt vergeturi roșii noi.



Striae Albae
sunt vergeturi mature, mai albe și atrofice.

Stratamark - un produs medical revoluționar pentru prevenirea și tratarea vergeturilor

Stratamark este o formulă de gel transparent, cu uscare rapidă, pentru prevenirea și tratamentul Striae Distensae (vergeturi).

Stratamark a fost dezvoltat pentru prevenirea și tratarea tuturor tipurilor de vergeturi, în special a celor care acoperă o suprafață mare, rezultate în urma sarcinii, a creșterii în adolescență, a creșterii sau pierderii în greutate sau a culturismului.

Stratamark a fost dezvoltat pentru a se răspândi cu ușurință pe suprafețe mari ale corpului (de exemplu, fese, abdomen, coapse, sâni și spate), precum și pe zonele expuse și sensibile.

FORMATOR DE PELICULĂ, FLEXIBIL, CU CONTACT COMPLET
Stratamark se usucă pentru a forma o peliculă protectoare subțire, transparentă și durabilă, care asigură un contact constant cu pielea (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână).

HIDRATARE
Stratamark este semipermeabil, ceea ce permite pielii să respire și să rămână hidratată.

ÎNMOAIE ȘI APLATIZEAZĂ
Stratamark înmoaie și aplatizează vergeturile ridicate și atrofice.

AMELIORARE SIMPTOMATICĂ
Stratamark ameliorează mâncărimile și disconfortul provocat de vergeturi.

REDUCE ROȘEAȚA ȘI DECOLORAREA
Stratamark reduce roșeața și decolorarea asociate vergeturilor.

NON-REACTIV
Stratamark este inert, nu are un pH măsurabil, nu conține alcool, parabeni sau parfumuri și nu pătrunde sub nivelul stratului cornos, ceea ce îl face potrivit pentru femeile însărcinate, pentru copii, mame care alăptează și persoane cu pielea sensibilă.

Stratamark este dovedit clinic că previne și tratează vergeturile[3]

Brațul de prevenire
n=148 femei însărcinate fără vergeturi **existente** în zona abdomenului


Brațul de tratament
n=155 femei însărcinate cu vergeturi **existente** în zona abdomenului


Grupul de control

Prevalența raportată a vergeturilor variază între 50-90%, majoritatea grupurilor de control prezentând între 60% și 70% vergeturi dezvoltate în timpul sarcinii, în funcție de populația studiată.[1]

60-70%

Prevenția vergeturilor cu Stratamark





Tratamentul vergeturilor cu Stratamark

88%
pacienții au raportat o îmbunătățire a culorii

86%
pacienții au raportat reducerea vizibilității

83%
pacienții au raportat reducerea pruritului





Este un tratament topic de sine stătător al vergeturilor[4]

Brațul de prevenire
n=139 femei însărcinate **fără** vergeturi recrutate de la 26 săptămâni de sarcină

Brațul de tratament
n=133 femei **cu** vergeturi de orice cauză după naștere

Prevenția vergeturilor cu Stratamark






Tratamentul vergeturilor cu Stratamark

73%
pacienții au raportat o îmbunătățire a culorii

90%
profesioniștii din domeniul sănătății au evaluat eficacitatea Stratamark ca fiind excelentă sau foarte bună


2 luni după naștere.
Începerea tratamentului cu Stratamark


6 luni după naștere.
După 4 luni de tratament cu Stratamark

Cum se aplică Stratamark?



1. Asigurați-vă că pielea este curată și uscată.

2. Aplicați un **strat foarte subțire** de Stratamark pe zonele relevante cu vârful degetelor și distribuiți uniform pentru a forma un strat foarte subțire și lăsați gelul să se usuce.

3. Dacă este aplicat corect, Stratamark trebuie să se **usuce în 5-6 minute.**

4. Dacă durează mai mult să se usuce, probabil că ați aplicat prea mult. Îndepărtați ușor excesul cu un șervețel sau tifon curat și lăsați procesul de uscare să continue.

5. Odată uscat, Stratamark poate fi acoperit cu lenjerie intimă, creme de protecție solară sau produse cosmetice.

Indicații suplimentare

- Stratamark trebuie aplicat **o dată pe zi** sau după cum este necesar pentru a menține contactul cu suprafața afectată, sau conform recomandării medicului dumneavoastră.
    - Stratamark poate fi reaplicat **mai des** pentru a asigura un contact constant cu pielea sau pentru a reduce simptomele.
    - Spălarea, probabil, va îndepărta Stratamark. **Reaplicați** Stratamark după fiecare spălare.
- Pentru rezultate optime, Stratamark trebuie menținut în contact continuu cu pielea (24 de ore pe zi/7 zile pe săptămână).
- **Nu sunt necesare creme hidratante, loțiuni etc.** Stratamark poate fi reaplicat mai des pentru a evita senzația de piele uscată și întinsă, deoarece Stratamark previne evaporarea apei prin pielea deteriorată care poate cauza această senzație. Se pot aplica creme hidratante după ce Stratamark se usucă pentru a menține primul contact al Stratamark cu pielea. Spre deosebire de Stratamark, cremele hidratante pot provoca iritații. Adăugarea oricărui produs suplimentar peste Stratamark poate reduce eficacitatea Stratamark.
- **Stratamark nu trebuie să fie frecat sau masat,** deoarece nu pătrunde în piele și nu își va spori efectul.
- Dacă nu este complet uscat, Stratamark poate păta hainele. Spălarea normală nu va îndepărta produsul de pe haine. În cazul în care apar pete, curățarea chimică ar trebui să fie capabilă să le îndepărteze fără a deteriora țesătura.
- Stratamark **nu trebuie aplicat peste alte tratamente pentru piele** fără sfatul medicului.

Durata tratamentului

Prevenirea vergeturilor în timpul sarcinii:
Stratamark este recomandat pentru utilizare de la începutul celui de-al doilea trimestru (13 săptămâni) sau la primul semn de apariție a vergeturilor. Tratamentul trebuie continuat după naștere timp de minimum 60 până la 90 de zile.

Prevenirea vergeturilor în perioada de creștere:
Stratamark trebuie utilizat pe durata perioadei de creștere sau până când pielea nu mai este bine întinsă. Tratamentul trebuie continuat apoi timp de 60 până la 90 de zile.

Tratamentul vergeturilor existente:
Stratamark trebuie utilizat timp de cel puțin 60-90 de zile (24 de ore pe zi/ 7 zile pe săptămână). Se recomandă utilizarea continuă până când nu se mai observă nicio îmbunătățire. Vergeturile severe și/sau mai vechi pot necesita un tratament mai îndelungat.

De cât Stratamark am nevoie?

Stratamark gel este o formulă avansată care necesită **mult mai puțin produs** pentru fiecare aplicare decât cremele hidratante sau preparatele cosmetice obișnuite.





Stratamark 20g
conține suficient gel pentru aproximativ o lună de tratament pentru femeile aflate în stadii avansate de sarcină



Stratamark 50g
conține suficient gel pentru aproximativ două luni de tratament pentru femeile aflate în stadii avansate de sarcină

La începutul sarcinii sau după naștere, un tub va dura mai mult timp datorită zonei mai mici de aplicare.

Stratamark®

pentru prevenirea și tratamentul vergeturilor



O inovație în prevenirea și tratarea vergeturilor

- Împiedică formarea anormală și excesivă a vergeturilor
- Înmoaie și aplatizează vergeturile ridicate și atrofice
- Ameliorează mâncărimile și disconfortul creat de vergeturi
- Reduce roșeața și decolorarea asociate vergeturilor
- Potrivit pentru femeile însărcinate, pentru copii, mame care alăptează și pentru persoane cu pielea sensibilă

Alte produse disponibile de la Stratpharma:

Stratamed și **Strataderm** ajută mamele să obțină cel mai bun rezultat posibil al cicatricilor după o operație cezariană.

Stratamed®

pansament avansat tip film pentru plăgi

Pasul 1 – Stratamed:

Stratamed este un tratament revoluționar ce poate fi aplicat imediat post operator, pe sutură, pe răni deschise și piele compromisă.



ro.stratamed.com

Strataderm®

gel pentru terapia cicatricilor

Pasul 2 – Strataderm:

Strataderm este recomandat pentru prevenirea și tratamentul cicatricilor hipertrofice și al cheloidelor, care poate fi aplicat imediat după îndepărtarea suturilor sau după epitelizarea rănii.



ro.strataderm.com

Dacă aveți întrebări despre Stratamark sau despre alte produse Stratpharma, contactați-ne la ro.inquiries@stratpharma.com

ro.stratamark.net

Atenție: Citiți întotdeauna prospectul, utilizați numai conform instrucțiunilor. Numai pentru uz extern. Consultați instrucțiunile de utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pentru instrucțiuni suplimentare, vă rugăm să consultați prospectul cu informații pentru pacienți (PIL).
Ingrediente: Polidimetilsiloxani, siloxani, siliconi alchilmetilici.
Referințe: 1. Osman, H., et al. (2008). *BJOG*, 115(9), pp. 1138-1142. 2. Hildago, LG. (2002). *American J of Clinical Dermatology*, 3(7), pp. 497-506. 3. Malkova, S. (2014). *Revista New EU Magazine of Medicine*, 1-4/4, pp. 1-7. 4. Hughes, CD, Hedges, A. (2018). *Australasian Journal of Dermatology*, 60(1), pp. 78-80.
Distribuitor pentru România: Stratpharma România S.R.L., str. Jiului nr.2, sector 1, București.
Fabricat de: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basel, Elveția.

CE Stratamark și Strataderm sunt dispozitive medicale de clasa I, cu marcaj CE pentru Europa, înregistrate TGA și FDA.

CE 2797 Stratamed este dispozitiv medical de clasa IIa, cu marcaj CE pentru Europa, înregistrat TGA și FDA.

Switzerland
Stratpharma
Heal Better™

SK-RO-011-3-0626