Stratamark®

para la prevención y el tratamiento de estrías

Un gran avance en la prevención y el tratamiento de estrías



es.stratamark.net

Stratpharma Iberia
Heal Better™

Las estrías pueden suponer algo más que un problema estético

Las estrías son una afección bien conocida y frecuente que puede ser motivo de gran **preocupación** e **inseguridad** durante y después del embarazo.[1]

Las estrías son un tipo de cicatriz anormal fina y aplanada. La causa de la aparición de estrías no se conoce del todo, pero se cree que se debe a un cambio anormal en el tejido subyacente de la piel o a **cambios hormonales** asociados al embarazo, la pubertad, el culturismo, la terapia hormonal sustitutiva, etc.[2]

Aunque no son perjudiciales para la salud, las estrías pueden provocar **síntomas físicos** como picor, sensibilidad y dolor. Debido a su aspecto visual, también pueden afectar significativamente a la **autoestima** y la imagen.[1]

Striae Distensae es el término genérico para las estrías, pero existen varias clasificaciones diferentes:

- **Striae Gravidarum** describe las estrías que se producen debido al embarazo.



- **Striae Rubrae**
  Las Striae Rubrae son estrías nuevas, rojas.



- **Striae Albae**
  Las Striae Albae son estrías maduras, más blancas y deprimidas.

Stratamark®: un producto sanitario innovador para la prevención y el tratamiento de estrías

Stratamark es una formulación en gel transparente de secado rápido para la prevención y el tratamiento de estrías.

Stratamark ha sido desarrollado para la prevención y el tratamiento de todo tipo de estrías, en particular las de gran superficie, provocadas por el embarazo, el crecimiento en la adolescencia, el aumento o la pérdida de peso o el culturismo.

Stratamark ha sido desarrollado para extenderse fácilmente por grandes superficies del cuerpo (nalgas, abdomen, muslos, pecho y espalda), así como por zonas expuestas y sensibles.

PELÍCULA, FLEXIBLE Y DE CONTACTO TOTAL
Stratamark se seca para formar una película protectora fina, transparente y duradera que garantiza un contacto constante con la piel (24 horas al día/7 días a la semana).

HIDRATACIÓN
Stratamark es semipermeable, lo que permite que la piel respire y se mantenga hidratada.

SUAVIZA Y APLANA
Stratamark suaviza y aplana las estrías elevadas y deprimidas.

ALIVIO SINTOMÁTICO
Stratamark alivia los picores y las molestias de las estrías.

REDUCE EL ENROJECIMIENTO Y LA DECOLORACIÓN
Stratamark reduce el enrojecimiento y la decoloración asociados a las estrías.

NO REACTIVO
Stratamark es inerte, no tiene pH medible y no contiene alcohol, parabenos ni fragancias y no penetra por debajo del nivel del estrato córneo, por lo que es adecuado para mujeres embarazadas, madres lactantes, niños y personas con piel sensible.

Stratamark®, demostrado clínicamente que previene y trata las estrías[3]

Grupo de prevención
n=148 mujeres embarazadas **sin estrías** en la zona del abdomen

Grupo de tratamiento
n=155 mujeres embarazadas con estrías existentes en la zona del abdomen

Grupo de control

La prevalencia de las estrías oscila entre el 50 y el 90%, y la mayoría de los grupos de control muestran entre un 60% y un 70% de estrías desarrolladas durante el embarazo, dependiendo de la población estudiada.[1]

60-70%

Prevención de estrías con Stratamark

18.2%
Con estrías

81.8%
Sin estrías

- 52% estrías leves
- 33% estrías leves-moderadas
- 11% estrías moderadas
- 4% estrías moderadas-severas
- 0% estrías graves o muy graves

Tratamiento de estrías con Stratamark

88%
reportaron mejora del color

86%
reportaron reducción de la visibilidad

83%
reportaron reducción del picor



Stratamark®, tratamiento tópico para las estrías[4]

Grupo de prevención
n=139 mujeres embarazadas sin estrías reclutadas a partir de las 26 semanas de gestación.

Grupo de tratamiento
n=133 mujeres post-parto con estrías por cualquier causa.

Prevención de estrías con Stratamark

31.8%
Con estrías


68.2%
Sin estrías

- 94% estrías leves
- 3% estrías leves-moderadas
- 3% estrías moderadas
- 0% estrías moderadas-severas
- 0% estrías graves o muy graves

Tratamiento de estrías con Stratamark

73%
De los pacientes reportaron mejora del color

90%
De los profesionales sanitarios calificaron la eficacia de Stratamark como Excelente o Muy buena



2 meses después del parto.
Inicio del tratamiento con Stratamark



6 meses después del parto.
4 meses de tratamiento con Stratamark

Cómo utilizar Stratamark®



1. Asegurarse de que la piel está limpia y seca.

2. Aplique **una capa muy fina** de Stratamark en las zonas pertinentes con la punta de los dedos y distribúyalo uniformemente para formar una capa fina y deje que el gel se seque.

3. Cuando se aplica correctamente, Stratamark debería estar **seco en 5-6 minutos.**

4. Si tarda más en secarse probablemente haya aplicado demasiado. Retire suavemente el exceso con un pañuelo de papel o una gasa limpia y deje que el proceso de secado continúe

5. Una vez seco, Stratamark puede cubrirse con ropa interior, protectores solares o cosméticos.

Direcciones adicionales

- Stratamark debe aplicarse **una vez al día** o según sea necesario para mantener el contacto con la superficie afectada, o según le aconseje su médico.
- Stratamark puede volver a aplicarse **más a menudo** para asegurar un contacto constante con la piel, o para reducir los síntomas.
- El lavado puede eliminar Stratamark. Vuelva a aplicar Stratamark **después de cada lavado**.
- Para obtener los mejores resultados, Stratamark debe mantenerse en contacto continuo con la piel (24 horas al día/7 días a la semana).
- **No se necesitan cremas hidratantes, lociones, etc.** Stratamark puede volver a aplicarse más a menudo para evitar la sensación de piel seca y tirante, ya que Stratamark evita la evaporación del agua a través de la piel dañada que puede causar esta sensación. Las cremas hidratantes pueden aplicarse después de que Stratamark se seque para mantener el primer contacto de Stratamark con la piel. A diferencia de Stratamark, las cremas hidratantes pueden causar irritación, Añadir cualquier producto adicional sobre Stratamark puede reducir la eficacia de Stratamark.
- **Stratamark no necesita ser frotado o masajeado,** ya que no penetra por debajo del nivel del estrato córneo y no potenciará su efecto.
- Si no se seca completamente, Stratamark puede manchar la ropa. El lavado normal no eliminará el producto de la ropa. Si se mancha, la limpieza en seco debería ser capaz de eliminarlo sin dañar el tejido.
- Stratamark **no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos** a menos que lo aconseje un médico.

Duración del tratamiento

Prevención de las estrías durante el embarazo: Se recomienda el uso de Stratamark a partir del inicio del segundo trimestre (13 semanas) o al primer signo de estrías. El tratamiento debe continuarse después del parto durante un mínimo de 60 a 90 días.

Prevención de las estrías durante los brotes de crecimiento: Stratamark debe utilizarse mientras dure el brote de crecimiento o hasta que la piel deje de estar tensa. El tratamiento debe continuarse durante 60 a 90 días.

Tratamiento de las estrías existentes: Stratamark debe utilizarse durante un mínimo de 60 a 90 días (24 horas al día y 7 días a la semana). Se recomienda su uso continuado hasta que no se observe ninguna mejora. Las estrías graves y/o antiguas pueden necesitar un tratamiento más prolongado.

¿Qué cantidad de Stratamark® se necesita?

El gel Stratamark es una formulación avanzada que requiere **menos producto** por aplicación que las típicas cremas hidratantes o cosméticos.





Stratamark 20g
contiene suficiente gel para aproximadamente un mes de tratamiento en las últimas etapas del embarazo.



Stratamark 50g
contiene suficiente gel para aproximadamente dos meses de tratamiento en las últimas etapas del embarazo.

Al principio del embarazo o después del parto, un tubo durará más debido a la menor superficie de aplicación.

Stratamark®

para la prevención y el tratamiento de estrías



Un avance en la prevención y el tratamiento de estrías

- Previene la formación anormal y excesiva de estrías
- Suaviza y alisa tanto las estrías abultadas como las deprimidas
- Alivia el picor y el malestar de las estrías
- Reduce el enrojecimiento y la decoloración de las estrías
- Adecuado para mujeres embarazadas, madres lactantes, niños y personas con piel sensible

www.es.stratamark.net

También disponible en Stratpharma:

Stratamed y Strata-triz ayudan a las madres a conseguir una mejor cicatrización después de una cesárea.

Stratamed®

película protectora para el cuidado avanzado de heridas

Paso 1 - Stratamed:

Cicatrización más rápida y prevención de cicatrices anómalas



www.es.stratamed.com

Strata-triz®

gel para el tratamiento profesional de cicatrices

Paso 2 – Strata-triz:

Para el tratamiento profesional de cicatrices anormales, tanto antiguas como nuevas



www.es.strata-triz.com

Precauciones: Lea siempre la etiqueta, utilice sólo según las indicaciones. Sólo para uso externo. Consultar las instrucciones de uso. Mantener fuera del alcance de los niños. Para más instrucciones, consulte el Prospecto de Información al Paciente (PIL)
Ingredientes: Polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilsiliconas.
Referencias: 1. Osman, H., et al. (2008). *BJOG*, 115(9), pp. 1138-1142. 2. Hildago, LG. (2002). *American J of Clinical Dermatology*, 3(7), pp. 497–506. 3. Malkova, S. (2014). *New EU Magazine of Medicine*, 1–4/4, pp. 1-7. 4. Hughes, CD, Hedges, A. (2018). *Australasian Journal of Dermatology*, 60(1), pp. 78-80.

Fabricado por: Stratpharma AG, Aeschenvorstadt 57, CH-4051 Basilea, Suiza
Stratpharma Iberia SL: Pº de la Castellana, 216 - 8ª Planta (Torre Realia), 28046 Madrid, España

CE 2797

Stratamark y Strata-triz - Productos Sanitarios de Clase I
Stratamed - Producto Sanitario de Clase II

Stratpharma Iberia
Heal Better™

SK-ES-011-2-0626